長壽

中華郵政特准掛號認為新聞紙類
每份四分　第九十四期
中華民國二十三年三月念三日
每逢星期五出版　全年五十期　連郵二元　國外加倍
館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內
◉內政部登記證警字第一一二七號◉
◉本報特聘請　吳之屏 方家楨　大律師為常年法律顧問◉

本期目錄

□卷頭語
求子方法
□性的常識
遺精症
性病與結婚
□胎產問題
婦女懷孕與癆病之辨別法
產婦衛生常識
□實用驗方
癲狗咬傷療法
□育兒常識
嬰兒薙髮不合衛生
小兒腹痛腹脹
□藥物研究
鹿茸麋茸出產辨
昆布海藻與瘰癧癭症
□用藥指南
胡黃連藥性之淺解
□長篇專著
癆疾自療法

求子方法

倒拖七道溝

瘦秋

婦女不育。是因為生理上的變態。這在稍有知識的人。總可以明瞭。（編者按。並且不一定是婦女生理上的關係。也許是男子生理上的關係。）但是我國的民衆醫藥常識。太不普及。而迷信舉動。倒是極為普遍。因為這種緣故。所以就發生種種荒謬的舉動。像求子咧。抱泥人咧。眞是難以枚舉。現在我所說的倒拖七道溝。就是迷信的一種。在江北的鄉間。很是盛行。

事實是這樣的。如有某一家的婦女。多年不能生育。她的丈夫。因為求子心切。就要實行倒拖七道溝了。先邀集幾個朋友。預備繩索。乘他妻子不防。把她撳倒。提着兩足。向前拖着走。一面由她丈夫問她。「你養不養」。這女人就要說「我養啦」。「我養啦」。於是這一幕趣劇。就算終了。據說。在從前非要拖過七道土溝不可。現在呢。總算改良了。祇要她回答「我養啦」以後。就把她釋放了。

在廢曆正月十六日。淮陰西門外洪門街的泥匠王學禮。曾頑過這一套趣把戲。當時她被拖得皮破血流。但是因為臉皮太嫩。不好意思說我養啦。然而她越是不說。她丈夫越拖得厲害。最後。經她丈夫打了幾下。她終屈服了。大喊「我養啦」。「我養啦」。

幸福書局出版醫藥新書
地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角
求孕與避孕　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角
腎病研究　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角
百病秘方　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分
保腦新書　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分
胎產問題　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

實用驗方

癲狗咬傷療法

（樂善居士）

癲狗噬人。自古無善治法。世所傳出虎符及加味人參敗毒散為最妙。然毒輕者或有效。毒重者不足恃也。此外單方不可勝計。而禁忌者甚多。如百日內不可聞金聲。一年內不得食肉之類。守之甚難。皆法之未盡善者也。歲己丑。象邑多癲犬。遭此害者。十死八九。諸方無效。適有耕牛。亦遭此患斃。剖其腹。獲血塊大如斗。色黧黑。攪之蠕蠕欲動。一方驚傳異事。有張君者。曉醫術。聞之悟曰。仲景云。瘀血在裏。其人發狂。又云。其人如狂者。血證諦也。下血。狂乃愈。犯此症者。大都如癲如狂。得非瘀血為之乎。不然牛腹中何以有此怪物耶。吾今得其要矣。於是用仲景下瘀血湯治之。不論毒之輕重。症之發與未發。莫不應手而愈。轉以告人。百不一失。乃知此方實此症之要治也。夫癲狗之患。自古而有。或謂腹中生小犬。蝕臟腑以死。非藥所能挽回。此因若輩無治法。始作此謬言以欺人耳。張君既洞悉其病原。又濟之以此方。天其憫斯人之無辜。而假手於張君以治之。爰將此方廣為傳佈。俾天下咸免此患。錄方藥於後。

生軍（三錢）　桃仁（七粒去皮尖）　地鼈蟲（七隻炒去足）　右三味研末。加白蜜三錢。用酒一盌。煎至七分。連渣服之。如不能飲酒者。用水對和亦可。小人減半。孕婦不忌。

（一）空心服此藥後。別設糞桶一隻。以驗大小便。大便必有惡物。如魚腸猪肝之類。小便如蘇木汁。數次後。藥力盡。大小便如常。再服。則無物。不下不拘帖數。總要大小便無絲毫惡物為度。不可中止。留餘毒於腹中。以致復發。切切牢記。

（二）此症既發。切不可吃斑毛等藥。蓋此時腹中惡塊已積。大如斗。不化其瘀血。而反以毒攻毒。必至悶亂而死。戒之戒之。

（三）患發之期。大都四十九日為多。近則二三十日。遠則六七十日百餘日不等。毒有輕重故也。

（四）此症最毒。不必肌膚皮肉。即衣服鞋襪。一被咬過。雖毫無損傷。其毒亦能傳染。余曾遭此患。不過棉鞋後跟。次日服藥。下有惡物無數。三劑方淨。可知其毒之烈也。倘因言淺而忽之。其後患可勝言哉。

（五）被咬者。倘不明其狗之癲與非癲。不妨服藥以驗之。若是癲狗。必下毒物。若是好狗。則大便冢溏而已。藥性和平。決無妨礙。

（六）仁人貴弭患於無形。倘有家狗。被癲狗所咬。即此藥灌之。既可救一物之命。且能免數十人之患。其德莫大矣。

（七）此藥較仙方為靈便。服者但忌房事數日而已、如鑼聲等事。一概不忌。

（八）倘疑此方有礙孕婦。是未知立方之意。夫桃仁春生。得生陽之氣。地鼈蟲穀食。得中和之性。酒以養陽。蜜以和陰。大黃能推陳致新。得蜜與酒。化苦寒為馴良。共成去瘀生新之功。則邪去正安。於孕婦更為有益。況被癲狗咬者。命垂頃刻。豈可拘泥有誤耶。經云。有故無殞。願志者深思之。

諺云。千方易得。一效難求。又云。丹方一味。氣死名醫。此方由自身經驗者傳來。靈效絲毫不爽。茲特刊布。藥品雖簡單。幸勿輕而忽之。倘望　善士仁人。廣為傳播。俾救急難。功德無量。

性的常識

□遺精症（孫克錦）

本症之原因；
一、因房事過度。或手淫。
二、必尿生殖器病。如淋病。膀胱結石。精囊炎。包莖。痔核等。
三、肺病。如結核之初期。
四、痔疾。
五、體質衰弱。如糖尿病。及傷寒之恢復期。無記憶力。貧血癡患。

診斷：本症診斷頗易。按患者所述之既往症。即可斷其爲遺精症也。

療法：戒手淫。寡色慾。節飲食。早起習運動。不宜多眠。其他用催眠法。電氣治法。水治法。藥品用 Bromkalin 內服。或 Lupulin 內服。

症狀；遺精者何。睡熟時陰莖勃起。精液射出之謂也。惟有生理及疾病遺精之別。生理遺精。每月一次或二次。睡夢之時。於恍惚迷離中。陰莖勃起。精液流出。非病也。若每夜有一次或數次。陰莖未曾完全勃起。而精液流出。亦有於日間醒覺時。亦能發生。此曰日間之遺精。午睡之時。或稍動身體。即有精液流出。此皆疾病遺精也。凡患遺精者。魄遲起。疲乏。顏面蒼白。

□性病與結婚

郭人驥

性病之中首爲黴毒。例如以健而美之女子。於結婚前。若未取得其男子之無病證明。倘無充分的治療。貿然與有黴毒傳染之少年男子結婚。其初雖無所感覺。然優游時日。迨及數月以後。則此少女身體疲勞逐日顯著。夜間頭痛。漸起貧血。心悸。脫落其美麗之頭髮。喪失悅耳之聲音。或起視力不良。眼邊疼痛。或尿有蛋白。鼻部腫痛。容貌憔悴。遂致步行困難。此正感染其夫黴毒之證據也。良人方面。若放任之。亦起種種類似於此之症狀。遂至二人共同陷於悲慘之運命。若此時有孕。則三四月後發起流產。若第二次起妊娠。則於五月流產。第三次妊娠。於六個月流產。以後若不流產。而能產兒。多於數週間死亡。幸而能育。亦必發起種種疾病。或舉步過遲。或起痙攣。要之決不能產生完善之兒女也。結婚後於適當之時期施行治療。倘不能免如斯之慘害。若猶諱疾忌醫。延誤其治療之時期者。又更甚於此矣。是以結婚前。若罹黴毒。即延期二三載。在此期間。充分治療其黴毒。迨至毫無傳染之危險而後結婚。爲最良之方法。然世之罹黴毒。其受治療並未充分而自以爲治愈者有之。此等殊爲危險。蓋以後種種可怖之疾病。倘可由此而發起也。同是性病。淋病之害。較諸黴毒雖無如斯之劇烈。然以之爲輕病。亦大謬也。女子之因淋病而起子宮內膜炎子宮外膜炎喇叭管炎卵巢炎等而成不妊者有之。若其焮衝傳於喇叭管。而達腹膜之時。則骨盤內腹膜亦起焮衝者有之。甚有化膿而需行外科手術者。或因種種合併症而喪失其生命者有之。即使輕症。亦起子宮內膜炎。展轉不治。終身不離藥石。或竟貽不妊症。其在男子。最初雖僅尿道焮衝而止。然有時因此而起副睪丸炎。亦有由此而不能生育（精蟲缺乏）者。或由淋病而起種種合併症者。例如膀胱炎關節炎等之發生。或其病毒有擴布於全身者。又罹淋病之女子若起妊娠。則分娩時。病菌侵入嬰兒之目。有致失明之虞。此外尚有一種性病。所謂軟性下疳者。此全與黴毒淋病各異。蓋僅侵害生殖器。而其症狀先於局部成一潰瘍。淋巴腺腫脹。次起化膿。此病亦自男子傳染於女子。而起潰瘍。故結婚前。亦不可不加以治療者也。

上海新新公司常年醫藥顧問　朱振聲醫士　上海世界書局常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元　號金不取
(乙)出診四元　路遠遞加
(丙)膏丸方四元　隔日取件
(丁)外埠問病二元　原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止出診四時以後
診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家
電話　九一四九二
掛號處啓

胎產常識

□婦女懷孕與癆病之辨別法（又良）

婦人懷孕。則月經停止。癆病亦月經停止。懷孕而兼子嗽。頗似癆病。癆病而兼腹脹。頗似懷孕。更有懷孕食少形瘦而類癆。癆病氣逆泛嘔而似孕。辨若不明。治必有誤。壽域黃泉。相距咫尺。可不愼者。爰將兩者之辨法。分述于下。以供家庭之實用焉。

（一）辨面色　懷孕面色紅潤光澤或略帶淡黃色。癆病面就白枯憔。或兩顴紅赤。

（二）辨舌苔　懷孕則舌上略有薄苔。捫之潤澤。癆病則舌上光絳。捫之乾澁。

（三）辨乳頭　懷孕則乳漸膨。乳頭呈紅褐色。癆病則乳房乾癟。乳頭呈灰白色。

（四）辨腹部　懷孕三四月之後。腹中漸覺動躍。癆病三四月後。腹中毫無動躍。

（五）辨症候　懷孕無潮熱盜汗。肌膚甲錯等症。癆病有潮熱盜汗肌膚甲錯等症。

（六）辨脈象　懷孕之脈。必陰搏陽別。兩關滑甚。癆病之脈。必弦細孔數。兩尺虛甚。

□產婦衛生常識（三）

三　產時衛生

△A　產期應注意之點　一。末次檢驗胎孕。在預定臨盆期的前幾天。須經產科醫師。檢驗一次。藉以斷定。(甲)胎位正常與否及產式方位。(乙)嬰兒之大小。(丙)盆骨之比例。以定生產難易。(丁)孕婦身體情形。如發現腹痛。以防臨產發生危險。二。延醫孕婦。在預定臨盆左右。必須延請產科醫師。或助產士診察接生。切勿使對於生理上醫學上莫明其妙。又不知消毒的舊式接生婆。或親屬接生。以免殘殺胎兒和孕婦。三。消毒。臨盆時孕婦之陰戶和接生者之兩手。必須用藥水消毒。墊布必蒸過。剪臍帶之剪刀。及臍帶布。也須消毒方能使用。否則產婦易得產褥熱症。嬰兒則有抽瘋的危險等。四。臨盆共分三期。(甲)自腹部陣痛起。至子宮口開全。這是第一期。此時孕婦當可隨意行動坐臥。(乙)自子宮口開全。孕婦即應躺臥床上。兒頭漸出子宮口至嬰兒全身產出。這是第二期。(丙)自嬰兒產出後。至胎盤流出止。這是第三期。產痛發作後。切勿急躁。或使勁。以免疲困力竭難產。五。陰道。孕婦之陰道。除產科專家外。不得用舊式接生婆或其他不懂醫學的人。用手探入。以免染毒。不發生產褥熱。六。會陰。(甲)會陰之保護。兒頭初出時。可用輕按兒頭勿使急出而撐破會陰。(乙)縫補會陰。會陰如撐破時。須立刻用線將破裂處縫補。否則容易染病和失去盤底托力。致有子宮下墜等現象。(丙)蓋護會陰。胎盤產後。出血正常即用消毒棉花。或紙墊蓋護起來。七。流血。產後流血過多。每以手按子宮。使之收縮。墊高臀部。並請醫師止血。八。嬰兒點眼藥。嬰兒生下臍帶剪斷包好後。即用百分之一硝酸銀。在嬰兒每眼中點一滴。以防淋病菌侵入而致瞎眼。B。產前及臨產的種種設備。孕婦在第七個月以前應預備臨產時種種物件作未雨綢繆之計，若七個月後則孕婦身體。日漸笨重。不宜操勞過度。倘遇嬰兒生出時不準確。則臨時匆忙失序。尤不相宜。一。孕婦未產之前。先預備房屋一間。房內的空氣光線。床之位置等。均須適宜。二。產婦預備之衣物列後。(甲)睡衣及哺乳衣兩件。(乙)襪子兩雙。(丙)被單兩條。(丁)紙墊六個。以粗紙置于布套內。用後即拆洗布套。(戊)油布一塊。爲保護褥墊之用。(己)丁字帶兩個。(庚)洗臉巾大小各一塊。(辛)大毛巾一塊。(壬)便盆或瓦盆一只。(癸)藥棉花及來蘇水無菌墊子。先行蒸過。或用熱熨斗熨過也可。C。產時佈置的程序及產婦的飲食。一。預先決定住醫院生產或請醫師或助產士在家生產。在醫院生產可免預備一切。若在家生產。當預備下列各物(甲)涼熱開水各一壺。作洗手之用。(乙)床上舖放油布及紙墊。(丙)佈置嬰兒的床。並宜使其溫暖。(丁)屋內什物。宜騰出。(戊)預備臉盆便盆併水桶及小孩應用衣服。二。產婦可隨意飲開水。食易消化食物。如牛奶。稀飯。嫩鷄蛋。鷄湯等。四。產後衛生。A。產後休養的重要。一。產婦產後。子宮必須經過六個星期。才能恢復原狀。產後若無休息。或下床過早。則子宮位及恢復情形。往往錯亂。

請讀者諸君注意

閣下如能預定本報贈送親友
定能使貴親友非常滿意
並且能夠使他一年不忘
既能祝貴親友長壽
又能使貴親友健康

化五角錢 送一年禮

敬啓者。本報自發行以來。條已三載。按期出版。從未脫期。信用之可靠。早已有口皆碑。亦毋庸贅述矣。仝人等鑒於民衆醫藥常識之普及。刻不容緩。故願犧牲精神與金錢。爲社會服務。經全體議決。自第三年起。（即第一百零一期至一百五十期止）報費分文不取。祇收全年寄費大洋五角。務使一般民衆。均能得到普通之醫藥常識。一則可以減輕醫藥費之負担。二則可以保障身體之健康。想閣下爲本報讀者。愛護之心。決不後人。定能極力介紹於親友之間。如能定送親友。必能使人十分滿意。在閣下祇費五角。又不麻煩。（報由本館按期代爲寄出）而貴親友則護益非淺。且可使他永遠感謝閣下之厚賜。歷一年而不忘也。（封袋上期期印出由某君贈閱）然乎否乎。希早定奪。爲日無多。幸勿交臂失之。

上海長壽週刊社啓

注意 未定者請即定閱 已定者請爲介紹

日期 自民國廿三年三月十六日起至四月十六日止外埠以郵戳爲憑過期仍收二元恕不通融

幸福書局代售各種良藥

地址 上海三馬路雲南路轉角

遺精散 有夢而遺 無夢而洩 久患新起 服之如神 每盒大洋一元

保腦丸 用腦過度 鼻流濁涕 腥臭異常 一服卽愈 每盒大洋五角

白濁丸 白濁初起 溺管刺痛 止濁定痛 效如桴鼓 每盒大洋一元

吐血靈丹 肝火犯肺 肺絡損傷 痰紅吐血 服之立止 每盒大洋五角

獺肝定痛散 女子善鬱 肝病時發 獺肝定痛 靈驗無比 每盒大洋四角

用藥指南

朱振聲

（六十）胡黃連（味苦而寒入於肝胆）

□主虛家骨蒸久痢　陰虛則生內熱。熱壯則血虧。是熱發於骨中。故成骨蒸。胡黃連苦能下火。寒能清熱。熱退則骨不蒸矣。久痢傷陰。陰虛傷形。胡黃連苦寒。善於涼血。卽能補陰。陰分足則熱退。利自然止矣。

□醫小兒疳積驚癇　小孩之易生疳積者。因脾土虛弱。濕熱鬱於脾胃。不能運化。則無津液敷佈於肌肉。故面黃肌瘦。其所以胃中能化五穀者。由邪火能消殺之力也。胡黃連苦能殺蟲。亦能化濕。寒能清熱。濕熱退則疳積愈矣。驚癇之證。由於陰虛生熱。熱生風。風動則筋亦動。筋動則驚癇之症發矣。胡黃連入于肝胆。功能去風。風去血生。血生則能養筋。筋受血養。驚癇自止。然當與補血藥同用。收效尤速。

名醫張壽甫先生遺著
衷中參西錄第七期 出版預告

傷寒論數百年的疑難一語道破
於仲景心法之外出奇制勝
是食古不化的當頭棒
是徒尚空談的腦後鍼
未讀傷寒論者不可不先讀此書
既讀傷寒論者不可不再讀此書

全書一巨册。准於陽歷六月底出書。定價一元六角。在未出書以前。書資先惠者。概按一元收價。郵費在內。出版以後。概照定價。不折不減。同時訂購六部者。概按五部收價。

門人 李寶龢 高崇勛 張埜 等全啟

收件處天津法界大安里中西匯通醫社

長篇專著

瘧疾自療法（十七）

朱振聲

瘧疾醫案選粹（續）

（十）瘧熱傷胃陰液消亡

陰液消亡。小溲短赤。皆瘧熱所傷。不飢不納。陰藥勿以過膩。甘涼養胃爲穩。

人參二錢　生地四錢　天冬三錢　麥冬三錢　川斛三錢　蔗漿一碗另服資生丸

（十一）瘧疾刦汗變生痙症

舌白脈小。暑邪成瘧。麻黃刦汗。傷陽遂變痙症。今痰鹹有血。右脇痛引背部。不知飢飽。當先理胃津。

大沙參五錢　桑葉三錢　麥冬三錢　茯神四錢　生扁豆四錢　苡仁四錢

（十二）脾濕發瘧口湧甜水

口湧甜水。脾癉

川連五分　黃芩二錢　厚朴錢半　半夏三錢　生乾薑六分　廣皮一錢　煎送脾約丸

（十三）先厥而瘧腹鳴吐蚘

先厥而瘧。蚘蟲下出。嘔逆腹鳴。脘痞窒塞。此厥陰瘧痰。勿得亂治。

川連五分　淡乾薑五分　薑汁五滴　川桂枝三分　生白芍錢半　烏梅肉六個　黃芩二錢　秋露水煎

（十四）瘧止復發溺濁淋痛

瘧已復瘧。溺濁淋痛。稚年脾瘧。食物不慎。色黃腹膨。有滯脾胃愈衰。東垣云。中氣不足。溲便乃變。初秋交冬。迭加反復。久則五疳癆瘵。當愼於食物。令脾胃氣蘇可效。宗脾胃論升降疎補法。

人參二錢　茯苓三錢　炙草八分　廣皮一錢　使君子錢半　神麯三錢　查肉三錢　麥芽三錢　澤瀉三錢

育兒常識

嬰兒薙髮不合衛生 (沈仲圭)

嘗考人身被毛髮之處有六。而各異其名稱。亦各有其作用。非徒事美觀也。一曰髮。所以護腦也。二曰眉。三曰睫。均所以防護眼球也。四曰鼻毛。所以防飛虫塵埃之侵入。五曰陰毛六曰腋毛皆防摩揩而傷飢膚也。故護之以毛。此人體六毛功用之大畧。而全身之毛不與焉。夫髮既爲護腦之物。則宜存留之也甚明。若剃之淨淨。如牛山之濯濯。不特有損儀表。亦非衛生之道。用是吾人於髮。雖有種種式樣而畧留些須。以資護腦則一也。成人之腦。尙知蓄髮以護之。則對於腦髓未充。腦蓋骨未長合之嬰兒。自應加意愛護。方無悖於攝生。今乃不然。生甫彌月。遽行薙去。幾以柔荑之頭。如漆之髮。爲世俗之犧牲品。甯非大謬不經之事耶。越醫裘吉生。余之忘年友也。客被女孫彌月。雖亦治延宴客。未能免俗。而薙髮之舉。毅然革除。迄今時隔期月。女孫之髮。並不甚長。且呈螺旋狀。美麗可愛。吾願世之爲父母者。以裘君爲法。以節金錢而重衛生也。

小兒腹痛腹脹 (黃兌楣)

凡小兒腹脹腹痛。多因食積。或寒涼傷脾而然。經曰。病痛者陰也。又曰。寒氣多也。有寒故痛也。東垣曰。寒脹多。熱脹少。皆主於脾胃。故凡小兒肚腹或痛或脹。雖曰積滯多所致。然脾氣不虛。則運化以時。何故作脹。是脹必由於虛也。若胃氣無傷。則腹中和緩。必無留滯作痛。是痛由於寒也。故治痛治脹者。必當以健脾暖胃爲主。若無火證。不得妄用寒冷。若無堅實拒按等證。不得妄用攻藥。愼之愼之。

一小兒肚腹膨脹。或時常作痛。惟芍藥枳實丸(一)加減主之。或以丸作煎藥亦可。又或用大健脾飲。(二)啓脾飲。(三)均可擇用。

一小兒偶因傷脾。氣促困倦。外見腹脹。而內不脹者。此脾氣虛也。宜用五味異功散。(四)或五君子煎(五)加味法主之。

一小兒肚腹作脹。或畏寒。或手足冷。或兼嘔吐泄者。此脾胃陽氣不足。虛寒作脹也。宜用溫胃飲。(六)或養中煎主之(七)。倘面白神疲。而又兼泄瀉水者。則即以經驗回陽飲(八)多服。

一小兒腹脹。或兼喘促泄瀉。而又多痰者。此脾腎陽虛。不可妄用消導。宜理陰煎主之。(九)

一小兒腹痛有滯。而吐泄者。此脾胃氣虛。宜用六君子湯。或用小和中飲均效。

一小兒偶因停滯。而腹一時大痛而脹者。宜用經驗排氣飲(十)加減法。或用大和中飲均宜。屢試屢效。

一小兒偶有宿食不消。而爲脹滿者。宜用清理導滯法。或用小和中飲亦可。

一小兒如實有堅積停滯。脹痛拒按。形氣具實者。宜用赤金豆。(十一)或百順丸(十二)攻下之。中病卽止。愈後須大補脾胃。卽以八珍湯。或壽脾煎。(十三)多服更妙。

以上皆大畧述其總綱。小兒柔嫩之質。氣血未充。不宜過於消耗。雖偶爾停滯。暫用推蕩。不可常恃。凡小兒疳證慢驚童子勞者。皆由攻伐太甚。致令病入膏肓。能隨時以補腎扶脾。雖病亦輕。卽出痲痘。不獨稀少。亦更無險症矣。

(一)芍藥枳實丸——焦白朮二兩。赤芍二兩。(酒炒)枳實一兩。(麵炒)陳皮一兩。爲末。以薄荷煎湯。煮老米爲丸如桐子大。

(二)大健脾飲——異防黨三錢。(米炒)炒穀芽二錢。炒香麥芽錢半。炒淮藥三錢。白蔻仁八分。雲苓二錢。陳皮錢半。枳殼八分。炒查肉二錢。法夏錢半。炮姜八分。炙草一錢。炒白朮二錢。

(三)啓脾飲——異閩黨四錢。(米炒)陳皮一錢。青皮八分。厚朴(薑汁炒)一錢。炒於朮二錢。棗芽。神曲各八分。砂仁一錢。炒乾薑八分。炙草一錢。(未完)

問病須知

(一)本報醫藥顧問欄。近因問病函件。積疊如山。仝人等雖日夜答覆。一時實難清理。對於以後問病函件。不得不另訂新章。以示限制。

(二)今後如定戶欲問病者。本埠須附郵五角。外埠一元。以示限制。空函恕不答覆。非定戶本埠一元。外埠二元。問病者須詳述「男女性別」「何時起病」「經過治療」「現在症狀」方能處方答覆。而不致有誤也。

(三)凡定戶來函問病時。除照章納費外。並須寫明定單號碼。否則。作非定戶論。

藥物研究

鹿茸麋茸出產辨 何心餘

茸爲國藥重要補品。習用已久。一至冬令。天序告藏。宜以服食補益精血。行銷頗廣。價值低昂以種類異。本國產物。大抵以北地爲上、而山門亦多。非精於其業者、不能猝辨。有麋有鹿。性狀各別。麋鹿皆山獸。凡大山多有此物。滇蜀閩廣。及國外之暹羅安南南洋。英荷各屬島。俱有出產。顧不能與國產比。緯度四十以上。氣候嚴寒。其茸壯而有力。南洋熱帶。多在緯線三五度之地。氣候宜發。其茸力薄。惟市上出售之茸。各產皆有。不可不辨。玆以素所考驗者。彙而記之。得其大畧。服茸者。若得吾說而參之。亦不爲無益云爾。

(一)北鹿茸。身圓毛黃。身分二叉。亦有三四叉者。每年夏至一陰生。則脫換一次。其叉之多者。因年而增。既老則止。盤以上至少二寸分叉。若僅寸外者。則非正北鹿。皮淡黃。帶白淡黑者。亦有之。頂圓而豐滿。左右相朝對。盤上珠點分明。門角牽頂骨薄。肉如蘆花色。功用則取紫潤圓短肥嫩者爲佳。否則鹿老而力遜。

(二)老麋茸身壯。毛帶紫黑色。身分三叉。一寸外便叉。每年冬至一陽生。則脫換一次。年增一支。其末分岐。卽與鹿同。頂圓而豐滿。皮淺黑色。多茸毛。其肉色似桃花。其頂色則似柿果。其色如朱。故北人名爲血柿茸。

(三)關東之鹿茸。身比北鹿壯些。皮黃有光。毛白如蘆花。身有紋透頂。深而且現。少血。頂無脚珠。肉紫青色。通身至合頂處有小孔。如木通狀。

(四)三姓所產之茸。甚難分辨。似鹿非鹿。似麋非麋。身肥瘦皆同北鹿。皮紫黑色。毛薄黃色。肉白而淡青。少血。頂角門闊。頂骨厚。若撚亦審其珠點之深淺。暉春之茸待考。(暫附記此條)自此以下。槪稱茸。其麋與鹿。殊難深辨。亦不必辨。(未完)

昆布海藻與瘰癧瘦症【續】 湯士彥

名稱 百分中 含量成分	石灰質	碘質	鐵質	砒質
昆布	二·三八	一·三四	——	二六，〇
海藻	七·二七	〇·三九	·〇九三	〇，五

因是而更可知上藥之價值矣。今試將余之製劑。分述如下。

(一)消瘦酒 治瘰癧瘦症之屬。於局部外科性者。特別有效。

(方劑)昆布半斤。海藻半斤。冰糖四兩。以上共浸酒二斤。密封於甕。待四日後。榨渣濾淨。每日用三兩。作三次分服。卽每次一兩。在飯後以開水對和可也。

(二)消瘦散。主治同上。

(方劑)昆布一两。海藻一兩。香附五錢。木香五錢。浙貝五錢。茯苓五錢。共爲細末。收貯候用。每日用六錢。作三次分服。卽每飯後以開水送服二錢可也。

舉例一 病人余濤。仕杭城紫荊橋。年三十八歲。患癭症。體質尙健。營養佳良。項左高凸如饅首。皮色如常。並不覺疼。微礙轉側。不咳嗽。無他兼狀。囑其日服三兩。十日來診。平其半。再余以消瘦酒。竟告愈。

舉例二 患者孟晉生。曾服務於前吳興警察總所。其右腮漫腫。如患痄腮。已歷年餘。並不感覺痛苦。惟甚礙觀瞻。頗引以爲憾。余每日投消瘦散六錢。分三次服。服一月後。消弭無形。(附注)患者服藥至三日後。忽起忌藥作用。自覺胃慾頓減。漾漾欲吐。頗爲不舒。余乃投以小蘇打五釐。(Bi-carb gr5)後亦漸安。此種不慣受藥而起之反響。有時當減其分劑。或覺停服。

以上所記。不過舉示大畧。然欲求治療之完善。當仍須顧其氣血之和。與夫筋絡之通鬯爲是。要不可以簡單之治法。而賅括繁複之症狀。以貽固於一病一因一治之譏也。